



**Campanha
de Vacinação
contra a GRIPE
H1N1 e Sazonal**

Esclarecimentos

Esclarecimentos sobre a vacinação contra o vírus da Gripe H1N1 e Sazonal

Algumas perguntas e respostas em relação à vacinação para Influenza em 2012

• Quais são as vacinas para Influenza presentes atualmente?

As vacinas contra influenza este ano podem ser encontrada na apresentação: Vacina trivalente que contém as três variantes do vírus A/ California/7/2009 (H1N1) pdm09-like virus; A/Perth/16/2009 (H3N2)-like virus; B/Brisbane/60/2008-like virus

.Na rede pública a vacina tá reservada para a população considerada de maior risco para infecção por este vírus que são trabalhadores de saúde, população indígena aldeada, crianças com idade entre seis meses e menores de dois anos (um ano 11 meses e 29 dias), pessoas portadoras de doenças crônicas conforme critérios definidos pelo Ministério da Saúde), adultos com 60 anos ou mais.

• Por que a gripe (Influenza) deve ser levada a sério?

A Influenza não deve ser julgada como "só uma gripe." É uma doença grave e, embora a maioria dos casos seja leve, alguns deles podem ser fatais.

• **Porque alguns grupos foram priorizados na vacinação do governo?**

Pelo fato de não ser possível a aquisição de número suficiente de vacinas para imunizar toda a população, o Ministério da Saúde, assessorado por especialistas de diversas áreas, selecionou os grupos de maior risco para serem vacinados, baseado em dados da doença em 2011 no Brasil e no mundo.

• **Quantas doses da vacina são necessárias?**

Os estudos demonstram que o uso de uma dose da vacina contra o vírus da gripe A H1N1 e sazonal 2012 para pessoas acima de 9 anos de idade induz a produção de níveis de anticorpos adequados. Para as crianças com idade entre 6 meses a 8 anos, são recomendadas duas doses da vacina, que devem ser aplicadas com um intervalo de no mínimo 3 semanas. Crianças menores de 6 meses de idade são jovens demais para receber qualquer vacina contra a gripe e não devem ser vacinadas.

• **Qual é o intervalo recomendado entre a primeira e a segunda dose para crianças de 6 meses a 9 anos de idade?**

O CDC recomenda que as duas doses da vacina contra o vírus da gripe 2012 devem ser separados por 4 semanas. Entretanto, com intervalo entre as doses

de pelo menos 21 dias, a segunda dose é considerada válida.

- **Quem é alérgico a ovo pode receber a vacina contra o vírus da gripe 2009 H1N1?**

Somente os indivíduos com reação anafilática ao ovo não devem receber a vacina contra o influenza.

- **Se o Paciente refere Influenza no ano anterior ele deve ser vacinado?**

Os sintomas da influenza (doença como gripe) são similares aos causados por muitos outros vírus. Para fins de imunização considera-se previamente infectados e portanto, sem necessidade de se imunizar, apenas os pacientes que apresentaram infecção pelo vírus H1N1 confirmados laboratorialmente.

- **Existem diferenças entre vacinas com e sem Adjuvantes?**

Adjuvantes são substancias que amplificam o poder imunizante das vacinas fazendo com que se necessite uma quantidade menor de antígenos para imunização.

- **Existem outras maneiras de impedir a propagação da doença?**

. As ações cotidianas de proteção são de grande importância;

. Cubra o nariz e a boca com um lenço quando tossir ou espirrar. Jogue o lenço no lixo depois de usá-lo.

. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar. Se o sabão e a água não estiverem disponíveis, use álcool gel.

. Evite tocar seus olhos, nariz ou boca, os vírus podem se propagar desta maneira.

. Se estiver doente, evite freqüentar ambientes fechados e aglomerações, além de evitar contato especialmente com crianças e portadores de doenças crônicas.

• **Grávidas podem ser imunizadas?**

Gestantes constituem grupo de maior risco para doença grave, hospitalização e morte pelo influenza. A vacinação deverá ser feita em qualquer período da gestação, com o intuito de proteger a grávida, e através da passagem transplacentária de anticorpos, proteger o recém nascido nos primeiros seis meses de vida.

• **Adolescentes e adultos devem receber quantas doses?**

Crianças acima de 9 anos, adolescentes e adultos devem receber uma dose da vacina contra o influenza, independente de ter recebido a vacina previamente em outros anos.

Fonte:

Sociedade Brasileira de Pediatria – Departamento de Infectologia
Sociedade Brasileira de Imunização

Tabela de vacinação contra Influenza para crianças entre 6 meses e 9 anos de idade

Situação	Vacina Sazonal anteriormente	Recomendação	Proteção esperada
Não recebeu vacina Monovalente H1N1	Sim	2 doses da vacina Trivalente	Adequada para o vírus pandêmico e sazonais
	Sim		
1 dose da vacina Monovalente H1N1	Sim	1 dose da vacina Trivalente	Adequada para o vírus pandêmico e sazonais
	Sim	2 doses da vacina Trivalente	Adequada para o vírus pandêmico e sazonais
2 doses da vacina Monovalente H1N1	Sim	1 dose da vacina Trivalente	Adequada para o vírus pandêmico e sazonais
	Sim	2 doses da vacina Trivalente	Adequada para o vírus pandêmico e sazonais

As orientações contidas neste livreto estão disponíveis nos seguintes sites:

www.sbp.com.br

www.sbim.org.br

www.vaninacaoinfluenza.com.br



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO